

Алгоритм действий при эпилептическом приступе

- Приглушить яркий свет
- Исключить громкие звуки
- Исключить травмы у питомца во время припадка (можно обложить мягкими подушками и покрывалами)
- **Не пытаемся достать язык!**
В отличие от людей, у животных не происходит западания языка. Питомец может травмировать Вас, так как находится без сознания.
- **Не пытаемся дать таблетки в пасть!**
Это может привести к аспирации у питомца (попадание препаратов в трахею и легкие). Также высокий риск получения травм у владельца (во время приступа животное не контролирует свои действия).
- **Снимите видео приступа для вашего ветеринарного врача**, если вы не показывали врачу ранее или приступ отличается от обычного.
- Разговаривайте с питомцем спокойным голосом можно звать его по имени или говорить знакомые слова

При отсутствии агрессии, рекомендовано контролировать общую температуру тела (измеряют ректально). В норме температура у животных до 39 - 39,5.

При температуре 40 градусов и выше, снижаем физическими способами (холодные компрессы на голову, в пах и подмышечные впадины)

- **Зафиксируйте дату в дневнике приступов.**
Если приступы учащаются, сообщите об этом вашему доктору.
- После приступа питомец может некоторое время не узнавать вас, быть агрессивным, наткаться на стены. Также у него может быть усиленный аппетит и жажда

Опасное состояние для питомца:

- Приступ более 5 минут
- Групповые приступы (2 и более приступа в течении суток)
- Тяжелый период восстановления после приступа (агрессия, слепота, восстановление более 24 часов)



Telegram



Информационный портал